

# СЭМД - ОСМОТР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА НОВЫЙ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 54»  
 195197 ул. Васильев, 9 т/ф 540-70-07

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 54»  
 195197, Санкт-Петербург, ул. Васильев, 9

Медицинская карта № 145400  
 Дата визита 11.11.2024 18:40  
 ФИО Мусина Ольга Борисовна  
 Дата рождения 04.04.1954  
 Адрес address\_for\_protocol

Жалобы	на изжогу, отрыжку воздухом, чувство кома в горле, сухой кашель после еды
Анамнез жизни	гепатит, туберкулез, ВИЧ, сифилис отрицает, аллергические реакции: отрицает
Анамнез болезни	в 2022 г. после ЭГДС диагностирована ГЭРБ. Рефлюкс-эзофагит. СГПОД 2-3 ст. Хр. эрозивный гастродуоденит. КАК, б/х 19.09.23 г. - норма. ЭГДС 19.10.23 г.: СГПОД. Катаральный дистальный рефлюкс-эзофагит. Хроническая смешанная (катаральная+атрофическая) гастропатия. Катаральный бульбит. Нр (+++). Принимала нольпазу, ганатон с временным положительным эффектом. 02.11.24 г.: ГПОД. Эндоскопические признаки недостаточности кардии. Эритематозная гастропатия. Распространенная атрофия слизистой оболочки желудка. Тест на H. pylori (-) отрицательный. УЗИ ОБП 02.07.19 г.: УЗ-признаки кальцината паренхимы печени, диффузных изменений паренхимы ПЖ, деформации ЖП.
Объективный статус	Общее состояние: Удовлетворительное. Аппетит: без особенностей. Рост, вес тела (ИМТ): 150 см, 60 кг.. Слизистые и кожные покровы: чистые, обычной окраски. Язык: чистый, влажный. Живот: мягкий, болезненный в пилородуоденальной зоне. Аускультация живота: без особенностей. Печень: при пальпации не увеличена. Селезенка: не пальпируется. Перитонеальные симптомы: нет. Стул: регулярный. Патологические примеси: нет
Диагноз	Хронический атрофический гастрит, Нр-негативный, обострение. Дисфункция сфинктера Одди по билиарному типу.
Обследование	1. УЗИ ОБП. Талон на 23.11.24 г.
Лечение	1. Нольпаза 40 мг по 1 таб 2 раза в сутки: перед сном и через 12 часов 2 недели, затем по 1 таб 40 мг 1 раз в день натошак еще 2 недели, затем по 1 таб 20 мг 1 раз в день натошак длительно. 2. Ганатон (итомед) 50 мг по 1 таб 3 раза в день за 20-30 мин до еды 1 месяц. 3. Ребагит 100 мг по 1 таб 3 раза в день до или после еды 2 месяца.
Явка	с результатами УЗИ ОБП.

Врач:

*Подпись*  
 П О Д П И С Ь

Беляев Николай Владимирович

Повтор 25.11.24 в 14<sup>00</sup>

