


**СПб ГБУЗ "Городской гериатрический центр"
СУРДОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**



иальный центр»

0-04-92, gorzdrav.spb.ru

инголога

невральная тугоухость справа

— подпись сурдолога, кардиолога

! Контроль Артериального Давления

Прием гипотензивных препаратов.

Биохимический анализ крови (сахар крови, липидограмма) 1 раз в год.

✓ Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи с функциональными пробами.

Курс поддерживающей терапии 2 раза в год (под контролем АД):

- Таб. Мексидол Форте (Tab. Mexidoli) 250 мг 1 таб. 2 раза в день 30 дней
- Таб. Нейромультивит (Tab. Neiromultiviti) 1 таб. 2 раза в день 30 дней

!!! Противопоказан прием ототоксических препаратов: антибиотики аминогликозидового ряда (гентамицин, канамицин, мономицин, полимиксин-В, софрамицин и др.), макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин), бисептол, петлевые диуретики (фуросемид, этакриновая кислота, бутамид), лидокаин (в стоматологии), метронидазол, препараты химиотерапии (цистплатин, азотистый иприт, винкристин), нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин (ацетилсалicyловая кислота), непроксен, индометацин), трициклические антидепрессанты (ксанакс, амитриптилин, паксил, рексетин, кломипрамин), хлорохин.

Льготное слухопротезирование не показано.

Слухопротезирование монауральное на правое ухо слуховым аппаратом средней мощности, цифровым многоканальным заушного типа

Контроль за состоянием слуха (тональная аудиометрия, импедансометрия) 1 раз в 12 мес. (направление от ЛОР-врача, осмотр ЛОР-врача, тональная аудиометрия действительны 1 год)

Врач сурдолог-оториноларинголог

Арутюнян К.С.



СПБ ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр»

СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

198103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., 21, лит. Е, тел. 490-04-92, gorzdrav.spb.ru

Консультация врача сурдолога-оториноларинголога

22.11.2024 г.

ФИО. Смирнов А.М., 1940 г.р.

Основной клинический диагноз: Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость справа – II степени, слева - III степени.

Рекомендовано:

Наблюдение сурдолога, кардиолога

! Контроль Артериального Давления

Прием гипотензивных препаратов.

Биохимический анализ крови (сахар крови, липидограмма) 1 раз в год.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи с функциональными пробами.

Курс поддерживающей терапии 2 раза в год (под контролем АД):

- Таб. Мексидол Форте (Tab. Mexidoli) 250 мг 1 таб. 2 раза в день 30 дней

- Таб. Нейромультивит (Tab. Neiromultiviti) 1 таб. 2 раза в день 30 дней

!!! Противопоказан прием ототоксических препаратов: антибиотики аминогликозидового ряда (гентамицин, канамицин, мономицин, полимиксин-В, софрамицин и др.), макролиды (эритромицин, азитромицин, кларитромицин), бисептол, петлевые диуретики (фуросемид, этакриновая кислота, бутамид), лидокаин (в стоматологии), метронидазол, препараты химиотерапии (цистплатин, азотистый иприт, винкристин), нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин (ацетилсалicyловая кислота), непроксен, индометацин), трициклические антидепрессанты (ксанакс, амитриптилин, паксил, рексетин, кломипрамин), хлорохин.

Льготное слухопротезирование не показано.

Слухопротезирование монауральное на правое ухо слуховым аппаратом средней мощности, цифровым многоканальным заушного типа

Контроль за состоянием слуха (тональная аудиометрия, импедансометрия) 1 раз в 12 мес. (направление от ЛОР-врача, осмотр ЛОР-врача, тональная аудиометрия действительны 1 год)

Врач сурдолог-оториноларинголог

Арутюнян К.С.

