


Иванова Зинаида Алексеевна 29.05.1947г.
Псковская область. Палкинский р.н. дер.Ручьи.

Осмотр, терапевта от 19.08.2026г.



Жалобы: на одышку при нагрузке, периодический дискомфорт за грудиной, головные боли, общая слабость, головокружения.

Анамнез: ИБС: стенокардия напряжения 2 ф. к. КАГ 23.10.25: без показаний к хирургическому лечению. НРС: постоянная форма фибрилляции предсердий. CHA2DS2-VASc 6 баллов. HAS- BLED 3 балла. ВПС: открытое овальное окно с минимальным сбросом. МН 2 ст. Фон: Гипертоническая болезнь 3 ст, недостигнутые целевые значения АД, очень высокий риск ССО, Осложнения: Рецидивирующая тромбоэмболия долевых ветвей легочных артерий. Хроническое легочное сердце.

Легочная гипертензия 2 ст ХСН с ФВ(60%) 3 ФК 1 ст

ЗНО тела матки 1В ст. (pT1bN0M0) G1- сост. после хирургического лечения от 07.2025 (ЛПТ: экстирпация матки с придатками) .Сопутствующие: Хронический вирусный гепатит С Узловой зоб, эутиреоз. Аденома паращитовидной железы слева. Сахарный диабет 2 типа.

Последствия ОНМК по ишемическому типу от 06.2024 г. ДЭП2ст.

ПТФС глубоких вен голени слева. Язвенная болезнь , ремиссия. Дивертикулез сигмовидной кишки.МКБ, , ангиомиолипома правой почки

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, нормальной окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД-15 в мин. Сатурация кислорода-98%. Тоны сердца аритмичные, приглушенные. АД-140\80 мм.рт.ст. Пульс-76 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в норме. Отеков нет.

Диагноз: ИБС: стенокардия напряжения 2 ф. к. КАГ 23.10.25: без показаний к хирургическому лечению. НРС: постоянная форма фибрилляции предсердий. CHA2DS2-VASc 6 баллов. HAS- BLED 3 балла. ВПС: открытое овальное окно с минимальным сбросом. МН 2 ст. Осложнения: Рецидивирующая тромбоэмболия долевых ветвей легочных артерий. Хроническое легочное сердце. Легочная гипертензия 2 ст ХСН с ФВ(60%) 3 ФК 1 ст Фон: Гипертоническая болезнь 3 ст, недостигнутые целевые значения АД, очень высокий риск ССО, Хронический гастрит. Последствия ОНМК по ишемическому типу от 06.2024 г. ДЭП 2ст. Сахарный диабет 2 типа.

Рекомендовано: Диета с ограничением поваренной соли и животных жиров.

Контроль АД и пульса 2рд

1. Ривароксабан (Ксарелто) 20 мг 1 раз в сут. в 19.00.
2. Розувастатин 40 мг в 19:00
3. Лозартан 50 мг мг в 07.00, 19.00.
4. Метопролол 25 мг в 07.00, 19.00.
5. Спиринолактон (Верошпирон) 25 мг в 07.00.
6. Рабепразол 20 мг в 07.30, 17.30 за 30 мин. до еды ежедневно
7. Форсига 10 мг утром ежедневно
8. Изосорбид мононитрат 20мг по 1табл. 2рд.
9. Нитроспрей по 1-2 дозы при приступе стенокардии.
10. Мексидол 125мг по 1табл 3раза в день 2месяца 3 курса в год.
11. Бетагистин 24мг по 1табл 2рд 2мес 3 курса в год.
12. Панангин по 1табл 3раза в день по 10 дней каждый месяц.
13. Предуктал 80 мг по 1табл 1рд 1мес. 4 курса в год
14. Октолипен 600мг по 1табл 1рд 2 курса в год.
15. гептор 400мг по 1табл 1рд 2 месяца 3 курса в год

