



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ

194291, Россия, Санкт - Петербург, пр. Культуры, д. 4,

ЦЕНТР ОСТЕОПОРОЗА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СКЕЛЕТА

194291, Санкт - Петербург, пр. Культуры, 4

www.med122.com

тел.: (812) 558 86 49

06/02/2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комарова Людмила Яковлена, 06.07.1939 года рождения обратилась в центр повторно через 6 месяцев после первой инъекции Пролиа.

Жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника, распространяющиеся в правое бедро, усиливающиеся при переноске тяжестей и после занятий физкультурой.

В анамнезе перелом правой бедренной кости в возрасте 32 лет, травматического характера. Компрессионный перелом L1 – тяжелой степени и L3 средней.

В 2010 году перелом луча левой руки, в 2012 году перелом луча правой руки. С детства страдает сколиозом. Менопауза в 54 года.

Впервые денситометрия была выполнена с 2004 году. Выявлена остеопения.

В 2016 году консультирована в ГБ 25, назначен препарат Фороза, но из-за появления признаков гастрита лечение прекратила. По данным денситометрии от 03.11.2017 в правой бедренной кости выявлен остеопороз с дефицитом МПК до 50%, в левом бедре до 40%.

29.11.17 года выполнена первая инъекция Пролиа, препарат перенесла хорошо. Последняя инъекция в июле 2020 года

По данным первой повторной денситометрии в бедре прибавка составила +5%, в шейке бедра +11%. Позвонки повторно не анализировались.

В последнем анализе – в позвонках выраженный сколиоз и остеопения, в правом бедре остеопороз и положительная динамика +2,3%

Обследована, исходно ПТГ и кальций в пределах нормы. Но в повторных анализах выявлено повышение ионизированного кальция крови до 1,37 ммоль/л на фоне приема альфа Д3 ТЕВА 0,25 мкг. После отмены альфа Д3 ТЕВА кальций снизился до 1,29 ммоль/л.

Результаты последних анализов не выявили отклонения от нормы. Но отмечено повышение ЛПНП. Пациентка злоупотребляет сливочным маслом.

Диагноз: Тяжелый постменопаузальный остеопороз

Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника

После получения результатов анализов начать лечение:

1. **Натекаль ДЗ (или Кальций ДЗ Никомед Форте)** по 1 таблетке 2 раза в день с едой, постоянно

Для усиления терапии тяжелой формы остеопороза пациентка нуждается в назначении препарата Форстео (Терипаратид).

Указаний в анамнезе данных за онкологические заболевания нет.

Обследование:

1. Клинический анализ крови
2. Щелочная фосфатаза
3. **Кальций крови ионизированный**
4. Фосфор крови
5. АЛТ
6. АСТ
7. Билирубин
8. Креатинин
9. **Липидограмму**
10. Глюкоза крови
11. Общий анализ мочи

Через 12 месяцев повторить денситометрию L1-L4 и правое бедро
И анализы

При обострении болей в спине

- Кетонал форте 100 мг по 1 таб 2 раза в день не более 1 недели
- Мидокалм (толперизон) 150 мг по 1 таб 2 раза в день – до 2х недель

Врач: Мазуренко Сергей Олегович



Контактный телефон: 89516430070